

嬰幼兒各項疫苗接種適合年齡及禁忌

疫苗種類	劑別	適合接種年齡	備註
B 型肝炎免疫球蛋白(母親 e 抗原呈陽性者)	一劑	出生 24 小時內	
B 型肝炎	第一劑	出生 24 小時內	
B 型肝炎	第二劑	出生滿 1 個月	
B 型肝炎	第三劑	出生滿 6 個月	
卡介苗	第一劑	出生 5-8 個月	
白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗(五合一)	第一劑	出生滿 2 個月	
白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗(五合一)	第二劑	出生滿 4 個月	
白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗(五合一)	第三劑	出生滿 6 個月	
白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗(五合一)	第四劑	出生滿 18 個月	
減量破傷風白喉非細胞性百日咳不活化小兒麻痺混合疫苗(四合一)	追加	滿 5 歲至入小學前	
麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗	第一劑	出生滿 12 個月	
麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗	追加	滿 5 歲至入小學前	
水痘疫苗	一劑	出生滿 12 個月	
日本腦炎-不活化疫苗	第一劑	出生滿 1 年 3 個月	
日本腦炎-不活化疫苗	第二劑	與第一劑間隔 2 週	
日本腦炎-不活化疫苗	第三劑	出生滿 2 年 3 個月	
日本腦炎-不活化疫苗	追加	滿 5 歲至入小學前	
日本腦炎-細胞培養活性減毒疫苗	第一劑	出生滿 1 年 3 個月	
日本腦炎-細胞培養活性減毒疫苗	第二劑	與第一劑 間隔 12 個月	
13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗(13PCV)	第一劑	出生滿 2 個月	
13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗(13PCV)	第二劑	出生滿 4 個月	
13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗(13PCV)	第三劑	出生滿 12-15 個月	
A 肝疫苗(2HepA)	第一劑	出生滿 12-15 個月	
A 肝疫苗(2HepA)	第二劑	與第一劑間隔 6 個月	

疫苗種類	禁忌
卡介苗	<ol style="list-style-type: none"> 1. 疑似結核病人及疑似被結核菌感染者，勿直接接種卡介苗。 2. 發燒、皮膚病、嚴重濕疹、慢性病、免疫機能不全、麻疹及水痘感染及其復原期。 3. 早產兒或體重在 2500 公克以下之新生兒。惟出生半年內如體重已達 2500 公克，經醫師診察確定可接種者不在此限。 4. 慢性疾病：如氣喘、肝臟病、心臟病、腎臟病等。
白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗 (五合一)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已知對 neomycin polymyxin streptomycin 或本疫苗中任何成份過敏者 2. 過去接種白喉、破傷風、百日咳混合疫苗、不活化小兒麻痺疫苗或 b 型嗜血桿菌疫苗之後，曾發生嚴重之過敏或不良反應者。 3. 先前接種含百日咳之疫苗 7 天後曾發生不明原因之腦或神經系統病變者。 4. 患有進行性痙攣症或神經系統疾病者。但已不再進行的神經系統疾病如腦性麻痺等，則不在此限。 5. 接種當日正在發燒或罹患急性疾病者，宜延後接種，但一般感冒則不在此限。 6. 七歲以上。
小兒麻痺	<ol style="list-style-type: none"> 1. 發高燒。 2. 免疫缺失者。 3. 正使用免疫抑制劑或高劑量腎上腺皮質素者。 4. 孕婦。
B 型肝炎	<ol style="list-style-type: none"> 1. 出生後嬰兒外表、內臟機能及活動力欠佳者。 2. 出生體重未達 2200 公克（出生一個月後或體重超過 2200 公克，即可注射）。 3. 有窒息、呼吸困難、心臟機能不全、嚴重黃疸（血清總膽色素大於 15mg/ml），昏迷或抽搐等嚴重病情者。 4. 有先天性畸形及嚴重的內臟機能障礙者。

水痘	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已知對 gelatin、neomycin 或本疫苗之其他成份過敏者。 2. 患有嚴重疾病或其他急性病症者。 3. 罹患白血病等惡性疾病或免疫不全者。 4. 正使用免疫抑制劑或高劑量腎上腺皮質素者。 5. 未經治療之活動性肺結核患者。 6. 懷孕者。
日本腦炎	<ol style="list-style-type: none"> 1. 發燒者 2. 患有嚴重的腎臟、肝臟疾病及心臟血管疾病者。 3. 患有進行性痙攣症或神經系統疾病者，但已不再進行的神經系統疾病，如腦性麻痺等，則不在此限。
麻疹 腮腺炎 德國麻疹三合一疫苗	<ol style="list-style-type: none"> 1. 嚴重急性呼吸道感染者或其他感染而導致發高燒者。 2. 免疫不全者。 3. 孕婦。
13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗(13PCV)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已知對疫苗任何成分（包括白喉類毒素）過敏者。 2. 出生6週以下者。 3. 過去注射同種疫苗後曾發生嚴重不良反應者。 4. 其他經醫師評估不適合接種者。
A 肝疫苗(2HepA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 先前接種本疫苗或對本疫苗任何成分曾發生嚴重過敏反應者。 2. 發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。 3. 孕婦。