

嬰幼兒各項疫苗接種適合年齡及禁忌

疫苗種類	劑別	適合接種年齡	備註
B 型肝炎免疫球蛋白(母親 e 抗原呈陽性者)	一劑	出生 24 小時內	
B 型肝炎	第一劑	出生 24 小時內	
B 型肝炎	第二劑	出生滿 1 個月	
B 型肝炎	第三劑	出生滿 6 個月	
卡介苗	第一劑	出生 5-8 個月	
白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗(五合一)	第一劑	出生滿 2 個月	
白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗(五合一)	第二劑	出生滿 4 個月	
白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗(五合一)	第三劑	出生滿 6 個月	
白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗(五合一)	第四劑	出生滿 18 個月	
減量破傷風白喉非細胞性百日咳不活化小兒麻痺混合疫苗(四合一)	追加	滿 5 歲至入小學前	
麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗	第一劑	出生滿 12 個月	
麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗	追加	滿 5 歲至入小學前	
水痘疫苗	一劑	出生滿 12 個月	
日本腦炎-不活化疫苗	第一劑	出生滿 1 年 3 個月	
日本腦炎-不活化疫苗	第二劑	與第一劑間隔 2 週	
日本腦炎-不活化疫苗	第三劑	出生滿 2 年 3 個月	
日本腦炎-不活化疫苗	追加	滿 5 歲至入小學前	
日本腦炎-細胞培養活性減毒疫苗	第一劑	出生滿 1 年 3 個月	
日本腦炎-細胞培養活性減毒疫苗	第二劑	與第一劑 間隔 12 個月	
13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗(13PCV)	第一劑	出生滿 2 個月	
13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗(13PCV)	第二劑	出生滿 4 個月	
13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗(13PCV)	第三劑	出生滿 12-15 個月	
A 肝疫苗(2HepA)	第一劑	出生滿 12-15 個月	
A 肝疫苗(2HepA)	第二劑	與第一劑間隔 6 個月	

疫苗種類	禁忌
卡介苗	<ol style="list-style-type: none"> 1.疑似結核病人及疑似被結核菌感染者，勿直接接種卡介苗。 2.發燒、皮膚病、嚴重濕疹、慢性病、免疫機能不全、麻疹及水痘感染及其復原期。 3.早產兒或體重在 2500 公克以下之新生兒。惟出生半年內如體重已達 2500 公克，經醫師診 察確定可接種者不在此限。 4.慢性疾病：如氣喘、肝臟病、心臟病、腎臟病等。
白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗 (五合一)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已知對 neomycin、polymyxin、streptomycin 或本疫苗中任何成份過敏者。 2. 過去接種白喉、破傷風、百日咳混合疫苗、不活化小兒麻痺疫苗或 b 型嗜血桿菌疫苗之後，曾發生嚴重之過敏或不良反應者。 3. 先前接種含百日咳之疫苗 7 天後曾發生不明原因之腦或神經系統病變者。 4. 患有進行性痙攣症或神經系統疾病者。但已不再進行的神經系統疾病，如腦性麻痺等，則不在此限。 5. 接種當日正在發燒或罹患急性疾病者，宜延後接種，但一般感冒則不在此限。 6. 七歲以上。
小兒麻痺	<ol style="list-style-type: none"> 1.發高燒。 2.免疫缺失者。 3.正使用免疫抑制劑或高劑量腎上腺皮質素者。 4.孕婦。
B 型肝炎	<ol style="list-style-type: none"> 1.出生後嬰兒外表、內臟機能及活動力欠佳者。 2.出生體重未達 2200 公克（出生一個月後或體重超過 2200 公克，即可注射）。 3.有窒息、呼吸困難、心臟機能不全、嚴重黃疸（血清總膽色素大於 15mg/ml），昏迷或抽搐等嚴重病情者。 4.有先天性畸形及嚴重的內臟機能障礙者。
水痘	<ol style="list-style-type: none"> 1.已知對 gelatin、neomycin 或本疫苗之其他成份過敏者。 2.患有嚴重疾病或其他急性病症者。 3.罹患白血病等惡性疾病或免疫不全者。 4.正使用免疫抑制劑或高劑量腎上腺皮質素者。 5.未經治療之活動性肺結核患者。 6.懷孕者。
日本腦炎	<ol style="list-style-type: none"> 1.發燒者

	<p>2.患有嚴重的腎臟、肝臟疾病及心臟血管疾病者。</p> <p>3.患有進行性痙攣症或神經系統疾病者，但已不再進行的神經系統疾病，如腦性麻痺等，則不在此限。</p>
<p>麻疹、腮腺炎、德國麻疹 三合一疫苗</p>	<p>1.嚴重急性呼吸道感染者或其他感染而導致發高燒者。</p> <p>2.免疫不全者。</p> <p>3.孕婦。</p>
<p>13 價結合型肺炎鏈球菌 疫苗(13PCV)</p>	<p>1.已知對疫苗任何成分（包括白喉類毒素）過敏者。</p> <p>2. 出生6週以下者。</p> <p>3. 過去注射同種疫苗後曾發生嚴重不良反應者。</p> <p>4. 其他經醫師評估不適合接種者。</p>
<p>A 肝疫苗(2HepA)</p>	<p>1.先前接種本疫苗或對本疫苗任何成分曾發生嚴重過敏反應者。</p> <p>2.發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。</p> <p>3.孕婦。</p>